

Datum:	24 mei 2025
Onderwerp:	Actualiteiten zaaiuien

Met wat neerslag in het vooruitzicht is het ideaal om bodemherbicide op zwarte grond aan te vullen. Onderstaand de mogelijkheden:

- **1 ltr/ha Wing P** *of*
- **0,75 ltr/ha Stomp**

Als laatste bespuiting tegen nakiemers :

- **2 – 4 ltr/ha Boxer**

Grassenbestrijding:

- **1 – 2 ltr/ha Centurion Plus** (hanepoot, raaigras, straatgras)
- **2 – 3 ltr/ha Fusilade Max** (raaigras, kweek)

Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met gangbare bodemherbicides zoals Stomp, Wing P, en Boxer. In dit geval maximaal 350 ltr/ha water gebruiken. Bij gebruik van Centurion Plus kan de toevoeging van Easy Mix een verbetering van het resultaat opleveren.

Easy Mix heeft toegevoegde waarde in hard water. Dit voorkomt verlies van actieve stof door vroegtijdige afbraak en hierdoor een slechtere werking als gevolg.

Voeg als eerste de Easy Mix toe aan de tankmix, en vervolgens de Centurion Plus!

Dosering Easy Mix: 1 ltr per 1000 ltr water



In (rode) uien hebben we de laatste jaren positieve praktijkervaringen met Stimuter. Dit product op basis van kruiden en knoflook verhoogt de vitaliteit en wortelontwikkeling van de gewassen. Toepassen wanneer eerste pijpjes ca. 10 cm zijn.



■ **10 ltr/ha Stimuter (± €50/ha)**

Na 7-10 dagen herhalen onder moeilijke omstandigheden.

Wanneer de meeste uienpijpjes 10 cm zijn is het ook een mooi moment om **N-xt Calcium** te spuiten. Door in het seizoen verse calcium te geven wordt de ui sterk en hard. Daarnaast is plant-beschikbare calcium een wapen tegen o.a. **Fusarium**. Naast calcium bevat het stikstof, wat direct opneembaar is voor de ui.

Veel percelen in de regio hebben problemen met de plantbeschikbaarheid van Calcium. Dit leidt ondanks mooie structuur van de grond voor problemen zoals Fusarium. Om tarra problemen te voorkomen en een maximale opbrengst te realiseren is voldoende Calcium beschikbaar hebben de sterkste basis.

	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Ca-plantbeschikbaar	kg Ca/ha	25	220 - 520					
Ca-bodemvoorraad	kg Ca/ha	6115	6020 - 9035					

N-xt Calcium kan met 7-gaats doppen of groffe spuitdoppen verspoten worden. Vóór of in de regen is een mooi toepassingsmoment, of op een afgehard gewas. Deze meststof kan puur verspoten worden of verdund met water.

■ **250 ltr/ha N-xt Calcium (30 kg N)**

Naast Calciumbemesting kunnen de eerste uien ook overbemest worden met kali en eventueel aanvullende stikstofbemesting.

■ **250 kg/ha Kaliumsulfaat (125 kg K)**

■ **200 kg/ha KAS 27% (54 kg N)** *of stikstof uit N-xt Calcium*

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen?

Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies.