

Datum: 23 maart 2022

Onderwerp: Onkruidbestrijding zaaiuien en suikerbieten

Bodemherbicide na het uienzaaien:

Met het wegvallen van Chloor-IPC en Pyramin is een goede inzet van de huidige (bodem)herbiciden zeer belangrijk voor een schone teelt. Spuit de bodemherbicide Stomp direct na het zaaien. De grond is dan nog iets vochtig en de Stomp werkt zo direct tegen de kiemende onkruiden. Wanneer dit niet gelukt is, dan de Stomp spuiten als de uien goed gekiemd liggen.

Direct na zaai:

■ 0,75 ltr/ha Stomp	tot 15% afslibbaar	<i>400 ltr/ha water</i>
■ 1,0 ltr/ha Stomp	vanaf 15% afslibbaar	<i>400 ltr/ha water</i>

Om ondanks het missen van o.a. CIPC een betere bestrijding van probleemonkruiden zoals klein kruiskruid, straatgras, ereprijs en varkensgras te hebben kan Boxer aan de basis toegevoegd worden. Voor opkomst is de toepassing van Boxer gewasveilig en effectief.

■ **1,0 ltr/ha Boxer**

Om inspoeling van de bodemherbiciden en hierdoor gewasschade te voorkomen kan Concrete aan de mix toegevoegd worden. **Concrete altijd als eerste aan de tank toevoegen!**

■ **0,4 ltr/ha Concrete HF**

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies.

