

Datum: 25 juli 2022

Onderwerp: Spruitremming in zaaiuien

Spruitremming in uien

De vroege percelen uien zijn bijna aan de spruitremming toe. In deze mailing leggen we uit waar u op moet letten bij het spuiten en wanneer het juiste moment is. Er zijn een aantal criteria die we in de gaten moeten houden om het juiste spuitmoment te bepalen. Eén daarvan is dat de uien **10-30%** gestreken moeten zijn. We kunnen ook kijken naar de bol-/nekverhouding, die minimaal 3:1 moet zijn. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig in de nekken te knippen. Zijn deze nog dik, dan is de sapstroom nog voldoende aanwezig en is de bespuiting nog niet aan de orde. Voelt u dat de nekken dunner gaan worden en dus insnoeren, dan zal de uienhals spoedig gaan knikken en dat is “het” moment om de bespuiting uit te voeren.

■ **8,9 ltr/ha Crown MH**

400 ltr/ha water

Uitvloeiers/hechters

Onder normale omstandigheden kan Agral Gold of Kantor gebruikt worden. Om de aandroogtijd te verkorten tijdens wisselvallige omstandigheden kan Designer ingezet worden.

- | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ■ 0,125 ltr/ha Agral Gold | ca €4/ha | <i>of</i> |
| ■ 0,45 ltr/ha Kantor | ca €12/ha | <i>of</i> |
| ■ 0,5 ltr/ha Designer | ca €30/ha | <i>(alleen bij wisselvallig weer)</i> |

Voor de goede werking van Crown MH zijn een aantal zaken belangrijk:

- Alleen spuiten op gezonde planten
- Indien mogelijk spuiten bij lagere temperaturen (**niet boven 25°C**) liefst 's avonds
- RV minimaal **50%**
- De droge periode na moment van toepassing dient minimaal **10 à 12 uur** te zijn.
- Deze bespuiting **niet** combineren met andere middelen
- Wilt u de Crown MH bespuiting en een ziektebestrijding uitvoeren op dezelfde dag, spuit dan eerst de Crown MH.
- Voor een optimale opname van Crown MH is het nodig dat het gewas na het spuiten **nog minimaal 14 dagen vitaal is**, zodat er voldoende middel in de bol komt.
- De tank moet goed schoon zijn!

